



Medicamentos Magistrales y Oficinales (medicina personalizada)

ACICLOVIR

Calle: Viveros de Asís No. 92; Col. Viveros de la Loma; C.P. 54080; Tlalnepantla de Baz; Estado de México.
Teléfono: (52-55) 2628-3669; 5365-9724; 2628-1522; 5384-2987; 5384-2985; 4437-1798; 4437-1797

Email: clientes@hervanario.com.mx

www.hervanario.com.mx

El aciclovir es un antiviral análogo de guanina. Se utiliza principalmente para el tratamiento de herpes simples tipos 1 y 2, y herpes zoster. Se usa por vía oral o tópica. El tratamiento es satisfactorio para las infecciones iniciales y recurrentes. El tratamiento prolongado con Aciclovir puede disminuir la incidencia de recaídas, que es particularmente importante en pacientes inmunosuprimidos. Las infecciones pueden reaparecer con la interrupción del tratamiento. El aciclovir también mejora el dolor y la cicatrización de heridas en casos de herpes zoster.

Uso recomendado

Para uso interno, la dosis recomendada es de 400mg a 1,000mg por día durante 5 a 10 días. Para niños mayores de 2 años, la dosis recomendada es la misma que para adultos, y Para niños menores de 2 años, la dosis debe reducirse a la mitad. Para uso externo, la concentración habitual es del 3% al 5%. Las formulaciones deben aplicarse a las lesiones aproximadamente 5 veces al día durante 5 a 10 días.

Reacciones adversas

El aciclovir es generalmente bien tolerado. Cuando aparecen los síntomas, pueden ser dolor de cabeza, náuseas, trastornos gastrointestinales, entre algunos otros.

Precauciones

Aciclovir debe administrarse con precaución a pacientes con insuficiencia renal porque puede agravar la enfermedad.

Observaciones

El aciclovir se puede usar en ungüentos oftálmicos a una concentración del 3%.

Referencias bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Forma médico-farmacéutica. Sao Paulo / SP: Tecnopress, 3a ed. 2006. 2. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guía de consulta completa farmacoterapéutico Barcelona 2a Ed. 2005.

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.
Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.

