



Medicamentos Magistrales y Oficinales (medicina personalizada)

ACIDO ACETIL SALICILICO

Calle: Viveros de Asís No. 92; Col. Viveros de la Loma; C.P. 54080; Tlalnepantla de Baz; Estado de México.
Teléfono: (52-55) 2628-3669; 5365-9724; 2628-1522; 5384-2987; 5384-2985; 4437-1798; 4437-1797

Email: clientes@hervanario.com.mx
www.hervanario.com.mx

ACIDO ACETIL SALICILICO

USO: INTERNO
FORMULA: C9H8O4
CAS: 50-78-2
PM: 180.0 G/MOL

El ácido acetilsalicílico es un antiinflamatorio no esteroideo salicilado con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. El ácido acetilsalicílico también inhibe la agregación plaquetaria. Se usa para aliviar el dolor leve y moderado en casos de dolor de cabeza, migraña y dolor dental. También se usa para tratar el dolor inflamatorio en trastornos reumáticos agudos y crónicos como la artritis reumatoide, la artrosis, etc. Se usa comúnmente en casos de resfriados y gripe, y puede reducir la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor muscular y articular. El ácido acetilsalicílico también se usa por su actividad antiplaquetaria y en el tratamiento inicial de trastornos cardiovasculares como la angina de pecho y el infarto de miocardio, y para la prevención de episodios cardiovasculares en pacientes en riesgo.

Uso recomendado

La dosis habitual de ácido acetilsalicílico como analgésico y antipirético es de 300 a 900mg cada 4 o 6 horas, según sea necesario. La dosis máxima administrada por día debe ser de 4g. Se puede administrar por vía rectal como supositorios. Las dosis recomendadas son de 600 a 900mg cada 4 horas, con una dosis máxima de 3,6g por día.

Reacciones adversas

Las reacciones adversas más comunes con el uso de ácido acetilsalicílico en las dosis habituales son trastornos digestivos como náuseas, dispepsia y vómitos. Además, puede producir irritación de la mucosa gástrica. Los síntomas digestivos pueden desaparecer si se administran con ácido acetilsalicílico con las comidas.

Precauciones

El ácido acetilsalicílico debe usarse con precaución, o incluso evitarse en pacientes propensos a dispepsia o lesiones de la mucosa gástrica. No debe administrarse a pacientes con hemofilia o trastornos hemorrágicos. Su uso también debe evitarse en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al medicamento u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.

Interacciones

Algunos de los efectos del ácido acetilsalicílico en el tracto digestivo aumentan con la ingesta de alcohol.

Referencias bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Forma médico-farmacéutica. Sao Paulo / SP: Tecnopress, 3a ed. 2006.

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.
Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.

