



Medicamentos Magistrales y Oficinales (medicina personalizada)

ANFEPRAMONA

(DIETILPROPION)

Calle: Viveros de Asís No. 92; Col. Viveros de la Loma; C.P. 54080; Tlalnepantla de Baz; Estado de México.

Teléfono: (52-55) 2628-3669; 5365-9724; 2628-1522; 5384-2987; 5384-2985; 4437-1798; 4437-1797

Email: clientes@hervanario.com.mx

www.hervanario.com.mx

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)

USO: INTERNO
FORMULA: C13H19NO
CAS: 90-84-6
PM: 205.30G/MOL

Indicaciones terapéuticas

Está indicado como auxiliar en el tratamiento de la obesidad exógena, asociado a un régimen dietético hipocalórico y de ejercicio.

Interacciones medicamentosas

La administración concomitante de la Anfepramona: Con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) está contraindicada, dado que se pueden presentar crisis hipertensivas graves, además la administración posterior o previa a un IMAO debe hacerse mínimo con 14 días de intervalo entre ambos fármacos. Con bloqueadores beta puede aumentar la actividad a nivel de los receptores adrenérgicos y amplificar los efectos colaterales asociados a su estimulación. Con antidepresivos tricíclicos se pueden presentar disritmias cardiacas, retención urinaria, constipación. Con la reserpina o las fenotiazinas se atenúan o anulan sus efectos. Disminuye la actividad antihipertensiva de la guanetidina y de la α -metildopa, entre otros. Con antigripales conteniendo efedrina se adicionan los efectos simpaticomiméticos. Con digitálicos, puede causar trastornos del ritmo cardiaco. En general, la ingesta de alcohol debe abolirse durante el tratamiento.

Reacciones secundarias y adversas

Estas corresponden a las descritas para los fármacos con actividad adrenérgica. Se presentan en baja frecuencia y son generalmente de ligera intensidad presentándose en individuos hiper susceptibles a los simpaticomiméticos, se puede presentar tolerancia a estos efectos al inicio del tratamiento. En caso contrario conviene interrumpir el fármaco. Nerviosismo, insomnio, excitación, fatiga, palpitaciones, taquicardia, disritmias, sequedad de boca y de mucosas, rubor, fiebre, náuseas, vómito, constipación o diarrea, rash, eritemas, disuria.

Dosis y vías de administración

Se recomiendan dosis máximas de 25mg tres veces al día sugiriéndose 25mg administrados 30 minutos antes de cada alimento. Se recomienda dar la última dosis antes de las 19:00 horas. La dosis máxima al día es de 75mg, la cual también se puede administrar en una sola toma al día antes del desayuno.

Referencias bibliográficas

1. Material del fabricante.

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.
Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.

