



Medicamentos Magistrales y Oficinales (medicina personalizada)

ASTRAGALUS

Calle: Viveros de Asís No. 92; Col. Viveros de la Loma; C.P. 54080; Tlalnepantla de Baz; Estado de México.
Teléfono: (52-55) 2628-3669; 5365-9724; 2628-1522; 5384-2987; 5384-2985; 4437-1798; 4437-1797

Email: clientes@hervanario.com.mx

www.hervanario.com.mx

ASTRAGALUS EXTRACTO SECO

USO: INTERNO

FORMULA:

CAS:

PM:

Indicaciones farmacológicas y acción

Adyuvante en el tratamiento de infecciones virales, influenza; como inmunomodulador que promueve el aumento de histamina; tratamiento de diarrea crónica; tratamiento de edema; tratamiento de sangrado uterino anormal; agente cardiotónico; complemento en tratamientos de quimioterapia y como estimulante general en situaciones de fatiga y estrés.

Toxicidad / Contraindicaciones

Se desconocen las contraindicaciones del producto. Sin embargo, debido a que estimula el sistema inmunitario, debe usarse con precaución por las personas que reciben terapia inmunosupresora, así como por la administración después de un trasplante de órganos y por aquellos que padecen enfermedades autoinmunes como el lupus. El astrágalo contiene una cierta cantidad de selenio. Cuando se toma en grandes cantidades o durante un período prolongado, este mineral puede causar pérdida de cabello, pérdida de dientes y fatiga. Consulte a un médico antes de tomar astrágalo durante el embarazo o la lactancia.

Dosis y uso

70% de extracto seco estandarizado: 100mg, hasta dos veces al día.

Referencias bibliográficas

BATISTUZZO, S.A de O; ITAYA, M .; ETO, Y., Medical-Pharmaceutical Form, technopres, 2000, SP. Inmunomoduladores de hierbas medicinales chinas. LI, Xiao-Yu. Mem. Inst. Oswaldo Cruz [en línea]. 1991, vol.86, supl.2, pp. 159-164. Chevallier A. La enciclopedia de plantas medicinales. Nueva York, NY: DK Publishing; 1996

Esta información se basa en referencias científicas y fue desarrollada por el Departamento Técnico.

Toda la información contenida en este material ha sido investigada en literatura específica y debe ser revisada por el médico antes de su adopción en la clínica.

